20:01
进度
1.1 绪论-第一课时
100%
1.1 植物的基本特征.mp4
视频(5.4分钟)
75/75
1.2 植物在生物界的地位.m...
视频(4.9分钟)
75/75
1.2 第二课时
100%
1.3 植物多样性及其保护.m...
视频(9.5分钟)
75/75
1.4 植物与自然和人类生活...
视频(5.5分钟)
75/75
视频(10.5分钟)
75/75
2.1 第一课时 植物细胞1
97%
2.1 植物细胞的概述.mp4
视频(6.5分钟)
73/75
2.2 第二课时 植物细胞2
97%

20:00
默认班级
89%
平均完成率
76.27
平均分
本月访问量
详情
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
课程讨论区
详情

20:06
19园林六、七班植物学(76)
72人在线
管理员 苏艳艳
同学们，明天早晨记得起来上课
星期一 22:05
7班王龙彦
好嘞
星期一 22:11
七班宁佳仪
好嘞
群主 刘志虎
好嘞
六班邢璐瑶
好嘞
发送

20:08
植物学作业
所有同学
都完成作业啦！
已完成的作业
6班邹舒怡 A+
六班耿晓晗 A+
七班杨可涵 A+
6班 孙新钰 A+
七班刘雯欣 A

19园林六、七班植物学(76)
+1
接骨草

19园林六、七班植... (76)
这个也是茎四棱，叶对生
昨天 13:21
这谁认识.....
老师果然见多识广



7班雷堃的作业

下一份

7班雷堃的作业

一、

①在完成初生生长后，中柱鞘细胞重光开始恢复分生能力，转化为木栓形成层、维管形成层，并长出侧根。

②初生木质部和初生韧皮部之间的薄壁细胞及初生木质部附近的中柱鞘细胞恢复分生能力，形成了维管形成层

③形成层向外分生分化次生韧皮部，加在初生韧皮部之内，向内分生分化次生木质部，加在初生木质部之外，这样就形成了次生维管组织

④木栓形成层向外分生分化木栓层，向内分生分化栓内层，木栓层、木栓形成层和栓内层合称为周皮。表皮被撑毁。

二、特点：①只有初生结构，没有形成层和次生结构

②内皮层常在径向壁、横向壁和内切壁形成五面加厚。同时，正对着初生木质部处的内皮层细胞常常停留在凯氏带的阶段，称为通道细胞。

③维管柱(中柱)为多元型，中央有发达的髓，由薄壁细胞

7班雷堃的作业

下一份